

FMC

# CDQ™ SX®

## Ugrasmiddel

GROUP 2 HERBICIDE

### Metsulfuron-metyl og tribenuron-metyl - Vannløselig granulat

**Bruksområde:** Mot tofrøbladet ugras i høst- og vårhvete, rug, rughvete, bygg, høstbygg og havre, uten gjenlegg.

Sammensetning:

Metsulfuron-metyl (CAS: 74223-64-6).....	111 g/kg
Tribenuron-metyl (CAS: 101200-48-0).....	222 g/kg
Fyllstoffer.....	667 g/kg

Reg. nr. 2017.17.21 Avgiftsklasse 1

**Bruksretledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke CDQ™ SX® i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.**

**LAGRING:** Uåpnet pakning skal oppbevares tørt. Åpnet pakning lagres tørt og godt lukket.

**FORSIKTIGHETSREGLER:** Bruk vernehansker av nitril e.l. og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av damp/sprøyteåke, skal halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 brukes. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

**Registreringsholder:**

FMC Agricultural Solutions A/S  
Thyborønvej 78, DK-7673 Harbøere, Danmark  
Tel.: +45 9690 9690 www.fmcagro.no

**ADVARSEL** UFI: HUYW-N2XQ-0N4N-3E4J

Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 4 % av produktet består av ingredienser med ukjent inhalasjonstoksisitet. Inneholder tribenuron-metyl. Kan gi en allergisk reaksjon. Unngå innånding av aerosoler. Oppbevares innelåst. Oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk verneutstyr (se forsiktighetsregler). Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).



Nettoinnhold: 100g e



Fabrikasjonsnr. / Fabrikasjonsdato :

P 032C P 2408C CYAN MAGENTA YELLOW BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	NORWAY	Single label	
Product SKU	11006197	Base for Booklet	
Product SKU Description	CDQ SX_100G_NO	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22056274	Number of pages (Booklet)	8 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_100G_CDQ SX_NO_2	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

**BRUKSOMRÅDE**

CDQ™ SX® ugrasmiddel er tillatt brukt i høst- og vårhvete, rug, rughvete, bygg, høstbygg og havre uten gjenlegg.

**VIRKEOMRÅDE**

CDQ™ SX® ugrasmiddel er et bredtvirkende herbicid til bekjempelse av de fleste 2-frøblada ugrasarter i vårkorn og høstkorn uten gjenlegg.

**Ugrasvirkning**

Når bruksrettedningen følges, har CDQ™ SX® ugrasmiddel meget god virkning (>85% effekt) på de fleste ugrasarter i korn. Nedenstående skjema viser virkningen av full dose CDQ™ SX® ugrasmiddel på flere ugrasarter.

155/150 x 70 - 11006197\_22056274\_LBL\_ML-F\_100G\_CDQ SX\_NO\_2\_BOOKLET\_8pages\_LEFT.indd 2

20-02-2023 12:59

BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	NORWAY	Single label	
Product SKU	11006197	Base for Booklet	
Product SKU Description	CDQ SX_100G_NO	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22056274	Number of pages (Booklet)	8 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_100G_CDQ SX_NO_2	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

Høstkorn	95-100% effekt	Balderbrå* Då Gjetertaske Høsegrasarter	Gullkrage* Haremåt* Hundepersille	Kamilleblom Kornblom* Kornvalmue* Linbelend	Meldestokk Oljevekster Orientveronika* Pengeurt	Rødtvetann* Tunbalderbrå* Åkersennep Vassarve	Åkerminneblom Åkerveronika*
	85-95% effekt	Jordrøyk* Tranehals* Tungras* Vindeslirekne*					
	<85% effekt	Bakkeveronika Åkertistel**	Åkerstemorsblom* Burot*				
Vårkorn***	95-100% effekt	Balderbrå Då Gjetertaske Høsegras-arter	Gullkrage* Haremåt* Hundepersille	Kamilleblom Kornblom* Kornvalmue* Linbelend	Meldestokk Oljevekster Orientveronika* Pengeurt	Rødtvetann* Tunbalderbrå* Åkersennep Vassarve	Åkerminneblom Åkerveronika*
	85-95% effekt	Jordrøyk* Tranehals* Tungras* Vindeslirekne*	Åkerstemorsblom* Burot*				
	<85% effekt	Bakkeveronika Åkertistel**					

Ved 2,7 gram CDQ™ SX® ugrasmiddel per daa + DP-klebemiddel

\* Frøbladstadiet til 2 varige blad

\*\* Frøspirte planter og planter som er 6-8 cm høye

\*\*\* maks 1,8 g CDQ™ SX® ugrasmiddel per daa + DP-klebemiddel i havre

BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	NORWAY	Single label	
Product SKU	11006197	Base for Booklet	
Product SKU Description	CDQ SX_100G_NO	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22056274	Number of pages (Booklet)	8 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_100G_CDQ SX_NO_2	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

**VIRKEMÅTE**

CDQ™ SX® ugrasmiddel opptas både gjennom bladene og røttene. Den optimale effekt oppnås på saftspente ugrasplanter med 2-4 varige blad i god vekst. Opptaket gjennom røttene øker, når jorden er fuktig.

CDQ™ SX® ugrasmiddel opptas hurtig og transporteres til plantenes celler. På følsomt ugras stopper dannelsen av livsviktige aminosyrer, så veksten stanser etter få timer, plantene slutter med å oppta vann og næring. Synlige symptomer kommer først senere, etter 1-3 uker. Først ses gulfarging av hjerteskeddet/vekstpunktet, deretter blir ugrasplantene slappe og visner bort. Nedvisningen går raskest under tørre, varme forhold.

CDQ™ SX® ugrasmiddel har god virkning ved lave temperaturer, hvis ugrasplantene er i aktiv vekst. Enkelte netter med nattefrost eller regn få timer etter sprøytingen påvirker ikke ugrasvirkningen.

Unngå alltid vindavdrift til åpent vann, lebelter, naboåkre eller arealer, hvor det skal dyrkes annet en korn.

**RESISTENS**

CDQ™ SX® ugrasmiddel inneholder de virksomme stoffene tribenuron-metyl og metsulfurometyl, som begge er sulfonylureaer og tilhører virkningsmekanisme-gruppe, ALS-hemmere: **HRAC-gruppe: 2.**

Når et ugrasmiddel eller en gruppe midler med samme eller liknende virkemåte brukes ensidig på samme areal flere år etter hverandre, kan naturlig resistente individ av en ugrasart selekteres fram, oppformeres og bli dominerende på arealet. Resultatet er resistens eller nedsatt følsomhet for midlet/middelgruppen. Om en ugrasart er resistent mot et sulfonylureamidell fra HRAC-gruppe B, er det kryssresistent mot andre midler med samme virkningsmekanisme. Resistens mot preparat tilhørende sulfonylurea-gruppen er kjent hos tilfeller av vassarve, samt enkeltstående tilfelle i balderbrå, då, linbendel, stivdylle og hønsegras i Norge.

Utvikling av resistens kan unngås ved å skifte mellom midler med forskjellig virkemåte, men med effektiv virkning overfor ugrasarten, eller ved å sprøyte ut en tankblending av disse to midler. Derfor skal midler fra ulike middelgrupper og/eller alternative bekjempelsesmetoder alltid inngå i bekjempelsesprogrammet.

**Anbefalinger:**

- For å forebygge resistensutvikling i vassarve eller andre vanlige ugrasarter brukes CDQ™ SX® ugrasmiddel, eller midler med samme virkningsmekanisme, i tankblending etter følgende retningslinjer:  
Det anbefales at CDQ™ SX® ugrasmiddel tankblandes med en anbefalt dosering av et fluroksypyrholdig produkt eller et mekoprop-holdig produkt. Preparat som inneholder mekoprop bekjemper vassarve, balderbrå og en rekke andre arter som har utviklet resistens. Primus® og Starane® XL kan også i visse tilfeller brukes, hvis det ikke er kryssresistens mot disse midlene. Bruk ikke CDQ™ SX® ugrasmiddel alene mer enn 2 av 3 år. Det tredje året må det brukes / skiftes til et middel fra en kjemisk gruppe med en annen virkningsmekanisme, tankblandes med dette eller kombineres med et ikke-kjemisk tiltak.

Følg HRAC's anbefalinger når du velger en annen type produkt. De anbefaler det ovennevnte og å bruke et allsidig vekstskifte med effektiv ugrasbekjempelse i hver kultur. Ugrasharving eller aktivt bruk av brakking er også bra tiltak for å unngå utvikling av herbicidresistens.

BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	NORWAY	Single label	
Product SKU	11006197	Base for Booklet	
Product SKU Description	CDQ SX_100G_NO	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22056274	Number of pages (Booklet)	8 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_100G_CDQ SX_NO_2	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

2. Dersom det alt er påvist resistens mot sulfonylurea på arealet, må CDQ™ SX® ugrasmiddel ikke brukes alene, det må blandes med et preparat med en annen virkningsmekanisme som er effektivt mot denne/de aktuelle ugrasarten(e). Dersom det konstateres resistens mot CDQ™ SX® ugrasmiddel, etter sprøyting, må arealet snarest mulig sprøytes på nytt med et effektivt middel med en annen virkningsmekanisme mot den/de aktuelle ugrasarten(e). Det er viktig å merke seg at vurderingen av preparatets risiko for helse og miljø er utført på preparatet alene, og ikke som en blanding med andre preparater.

#### LYSNING I FARGEN

Kornplantene kan under visse forhold få en forbigående lysere farge i 4 - 10 dager etter behandlingen.

#### BRUKSRETTLEDNING

##### Dosering:

Det må maksimalt brukes 2,7g granulat CDQ™ SX® ugrasmiddel pr. daa. per sesong

#### HØSTKORN

**Høstvetete, høstrug, rughvete og høstbygg:** Balderbrå, vassarve, oljevekster, då, gjeteraske, pengeurt, rødtvetann og andre ugrasarter nevnt med over 95% virkning (se tabell for effekt for andre ugrasarter).

#### Sprøytetidspunkt vår - dosering:

Best ugrasvirkning ved behandling tidlig når kornet og ugraset har kommet i god vekst om våren. CDQ™ SX® ugrasmiddel kan dog brukes med god virkning, senest inntil flaggbladet blir synlig i høstvetete, høstrug og rughvete - stadie 39. I høstbygg må CDQ™ SX® ugrasmiddel ikke brukes etter begynnende strekning - stadie 30.

#### Ugras 0-4 varige blad (BBCH 10-14) (oppfølging av høstsprøyting):

Dosering: 1,6 - 2 g granulat CDQ™ SX® ugrasmiddel pr. daa. + DP-klebemiddel

#### Ugras 0- 4 varige blad (ingen høstsprøyting, normalt er høyeste dose nødvendig)

Dosering: 1,6 - 2,5 g granulat CDQ™ SX® ugrasmiddel pr. daa. + DP-klebemiddel

#### Ugras > 4 varige blad og/eller dominerende åkerstemorsblom; normalt er høyeste dose nødvendig

Dosering: 2 - 2,7 g granulat CDQ™ SX® ugrasmiddel pr. daa. + DP-klebemiddel

#### Klengemaure:

Blandingen CDQ™ SX® ugrasmiddel + fluroksypyrholdig produkt kan sprøytes tidlig på våren, når åkeren/plantene er i god aktiv vekst, og de fleste klengemaureplanter har minimum 1 bladkrans. Hvis klengemauren ikke er langt nok framme, oppnås den beste samlede effekt ved å sprøyte CDQ™ SX® ugrasmiddel tidlig og andre fluroksypyrholdige produkter senere - evt. sammen med f.eks. soppsprøyting/stråforkorting (vekstregulering).

Dosering av CDQ™ SX® ugrasmiddel justeres ut fra ugrasflora, laveste dosering på smått ugras, hvis det er mange åkerstemorsblom, bør dosering heves til min. 2 g granulat, i visse tilfeller med svært mange åkerstemorsblom, kan 2,7 g granulat pr. dekar være nødvendig.

BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	NORWAY	Single label	
Product SKU	11006197	Base for Booklet	
Product SKU Description	CDQ SX_100G_NO	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22056274	Number of pages (Booklet)	8 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_100G_CDQ SX_NO_2	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

**VÅRKORN**

Best ugrasvirkning når ugraset er på frøbladstadiet - 4 varige blad, og plantene er god aktiv vekst. Dette sammenfaller normalt med kornets 2 - 4 bladstadiet. CDQ™ SX® ugrasmiddel kan dog brukes med god virkning, senest inntil flaggbladet er fullt utviklet i vårhvete og vårbygg - stadie 39. I havre må CDQ™ SX® ugrasmiddel ikke brukes etter begynnende strekning - stadie 30 og maks 1,8 g CDQ™ SX® ugrasmiddel. Då, balderbrå og andre ugrasarter nevnt med over 95% virkning (se tabell for effekt for andre ugrasarter). Behandling foretas på fuktig jord og saftspente ugrasplanter med frøblad - 4 varige blad.

**Dosering i bygg og vårhvete:**

1 - 2,7 g granulát CDQ™ SX® ugrasmiddel pr. daa. + DP-klebmiddel

Høyeste dosering ved mange åkerstemorsblom.

**Dosering havre:** 1 - 1,8 g granulát CDQ™ SX® ugrasmiddel pr. daa. + DP-klebmiddel

Da visse havresorter (bl.a. sorten Matilda) kan være litt følsomme overfor CDQ™ SX® ugrasmiddel, må det maksimalt brukes 1,8 g granulát CDQ™ SX® ugrasmiddel i havre pr. dekar. Følsomheten er særlig tilsted ved sene behandlinger og store utslag i temperatur, samt ved langsom vekst som følge av f.eks. tørke. Den laveste dosen kan i visse tilfeller være utilstrekkelig for å sikre en god ugrasbekjempelse. Tette kulturer vil dog vanligvis yte tilstrekkelig konkurranse, slik at dosen er tilstrekkelig. Tilsetning av klebmiddel kan eventuelt også utelates, da det forsterker risikoen for påvirkning av kulturen. Uten klebmiddel blir imidlertid virkningen på ugraset dårligere, spesielt på meldestokk.

**Gullkrage:** Behandling foretas på fuktig jord med saftspente ugrasplanter med frøblad - 4 varige blad. Høyeste dose er normalt nødvendig.

Dosering: 1,6 - 2,7g granulát CDQ™ SX® ugrasmiddel pr. daa. + DP-klebmiddel

**Tillaging av sprøytevæske**

Begynn alltid sprøytearbeidet med en ren sprøyte. Fyll tanken 1/2 med vann. Tilsett den beregnede mengde CDQ™ SX® ugrasmiddel direkte i tanken under omrøring, og først når granulátet er oppløst tilsettes en evt. blandingspartner. Fyll etter med vann. Like før sprøyteanken er helt full, tilsettes eventuelt sprede-/klebmiddel. Fortsett omrøringen inntil utsprøytingen er avsluttet. Sprøytevæsken skal sprøytes ut samme dag. Blandinger med andre midler skal dog sprøytes ut straks

**Sprøyteknikk, vannmengde og sprede-/klebmiddel**

CDQ™ SX® ugrasmiddel sprøytes ut med en teknikk som sikrer en god og ensartet dekning av ugrasplantene. Bruk flatsprededyser, f.eks. en ISO 110-02 dyse med et trykk på 2,0-3,0 bar eller en tilsvarende Low-drift dyse. For å sikre et optimalt opptak og virkning, kan CDQ™ SX® ugrasmiddel utsprøytes med tilsetning av et sprede-/klebmiddel, se anbefalinger. Der brukes normalt 10-20 liter vann per dekar. I meget tette og kraftige åkre, eller ved kraftig bestand av ugras, kan det være nødvendig å øke vannmengden for å sikre tilstrekkelig dekning.

**Anbefalte vannmengder og sprøyteknikk:**

*Korn (det brukes 10 - 20 l vann pr daa)*

BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	NORWAY	Single label	
Product SKU	11006197	Base for Booklet	
Product SKU Description	CDQ SX_100G_NO	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22056274	Number of pages (Booklet)	8 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_100G_CDQ SX_NO_2	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

**Dyse:** ISO F - 02-110 eller ISO LD-02-110  
Trykk på 2 bar og 7,8/6,3 km/time gir 10/12,5 l vann pr daa  
Trykk på 3 bar og 6,4/5,5 km/time gir 15/17,5 l vann pr daa

**Dyse:** ISO F - 025-110 eller ISO LD-025-110  
Trykk på 2 bar og 6,5/4,9 km/time gir 15/20 l vann pr daa  
Trykk på 3 bar og 8,0/6,0 km/time gir 15/20 l vann pr daa

**Anbefalt ikke-ionisk sprede-/klebemiddel:**  
DP-klebemiddel.  
Dosering: 50 ml/100 liter vann.

#### Begrensning i bruk- etterfølgende kultur

Hvis det er brukt opp til 2,7g granulat CDQ™ SX® ugrasmiddel pr. daa, kan det den følgende vekstsesong dyrkes høst- og vårløjevækster, poteter, mais til ensilering, korn evt. med gras-/kløvergjenlegg, erter, åkerbønner, lin og betær.

Det kan ikke dyrkes grønnsaker eller noen annen kultur enn de ovenfor nevnte, hverken det er CDQ™ SX® ugrasmiddel er brukt eller det følgende år.

#### Omsåing av et areal behandlet med CDQ™ SX® ugrasmiddel

Hvis en behandlet åker skal omsås, skal det kun sås korn. Innenfor den 1. måned etter behandlingen skal det kun sås vårvete eller havre, og det bør pløyes. Til ugrasbekjempelse i det omsådde korn skal det ikke brukes et sulfonylureaprodukt f.eks. et produkt som inneholder tribenuron-metyl, jodsulfuron, metsulfuron-metyl eller tifensulfuron-metyl eller et annet sulfonylurea-produkt.

For ugrasbekjempelse i omsådd korn bør det ikke brukes et sulfonylurea-produkt.

#### Blandbarhet

CDQ™ SX® ugrasmiddel kan generelt blandes med relevante ugras-, insekts- og soppmidler i korn. Det bør maksimalt blandes 2 produkter. Praktisk erfaring har vist at CDQ™ SX® ugrasmiddel kan blandes med DP-klebemiddel, Ariane® S, Express® 50 SX®, Delaro®, Harmony® Plus 50 SX®, CCC® Nufarm 750, Metaxon, Proline®, Ratio® Super SX®, Starane® XL, Talius® og Tomahawk® 200 EC.

#### LAGRING

Uåpnet pakning skal oppbevares tørt. Åpnet pakning lagres tørt og godt lukket.

#### FORSIKTIGHETSREGLER

Bruk vernehansker av nitril e.l. og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av damp/sprøytetåke, skal halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 brukes. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

#### RENGJØRING AV TOMEBALLASJE

Tomemballasjen skylles minst 3 ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken.

#### RENGJØRING AV SPRØYTEUTSTYRET ETTER CDQ™ SX® ugrasmiddel

Alle sprøyter skal ha tankskylledyse, og rentvannstank tilsvarende 10 - 15 % av tankens kapasitet, som sikrer at tilstrekkelig rengjøring innvendig kan skje i den åker, som nettopp er behandlet.

BLACK

	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	NORWAY	Single label	
Product SKU	11006197	Base for Booklet	
Product SKU Description	CDQ SX_100G_NO	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22056274	Number of pages (Booklet)	8 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_100G_CDQ SX_NO_2	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	

Sprøyten skal kunne skylles/vaskes så mye på åkeren, at restkonsentrasjonen i restvæsken i tanken er mindre enn 2 % av den opprinnelige konsentrasjon av preparatet. Dette kan gjøres ved å dele det rene vannet til 3 skyllinger/vask, hvor tanken er tømt så godt som mulig mellom hver skylling/vask.

#### Innvendig rengjøring av sprøyten.

**MERK!** Husk å aktivere alle haner og ventiler. Hev trykket så meget, at overtrykksventilen fra det selvrensende filter utløses.

1. Sprøyten tømmes helt for sprøytevæske.
2. Straks etter endt sprøyting skylles sprøyten med ca 1/3 av det rene vannet. Skyllvannet sprøytes utover den kulturen, som nettopp er sprøytet.
3. Fyll neste 1/3 rent vann i tanken og tilsett 0,5 liter All Clear® Extra rengjøringsmiddel. Sprøyt litt av vaskevannet ut gjennom bom og dyser, så disse settes i blott. La omrøring og tankskylledyse kjøre i minst 15 minutter. Sprøyt ut skylle-/vaskevannet over den kulturen som nettopp er behandlet.
4. Skyll tanken grundig med siste 1/3 rent vann og sprøyt skyllvannet utover den kulturen som nettopp er behandlet. Evt. åpnes bunnproppen og tanken tømmes helt i marken.
5. Utvendig rengjøring av sprøyte og traktor kan skje i åkeren (det velges et nytt sted hver gang og pass på avstand til drenering, åpent vann og brønner til drikkevann). Rengjøringen kan også skje hjemme på en plass med oppsamling av vaskevann enten i gjødselbeholder eller separat beholder. En uvasket sprøyte skal oppbevares under tak, eller i åkeren på det areal som nettopp er behandlet.
6. Dyser, filtre og siler kan avmonteres og renses i vann tilsatt 50 ml All Clear® Extra rengjøringsmiddel pr. 10 liter vann.

#### AVFALLSHÅNDTERING

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte preparatrestrester og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

#### MERK

Vi garanterer at produktet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at produktet under alle forhold har den forventede virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaringer. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten, bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.

Varemerke registrert av:

FMC, FMC logo, SX, Express, Harmony, All Clear, Ratio Super and DP- Klebemiddel are trademarks of FMC Corporation and/or its affiliates.

CDQ™  
©2017-2022 FMC Corporation. All rights reserved.

CCC, Nufarm 750® - Nufarm,  
Tomahawk® 200 EC, ADAMA;  
Delaro®, Proline® - Bayer CropScience;  
Talius® Ariane® S, Primus®, Starane® XL; Corteva.

BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	NORWAY	Single label	
Product SKU	11006197	Base for Booklet	
Product SKU Description	CDQ SX_100G_NO	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22056274	Number of pages (Booklet)	8 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_100G_CDQ SX_NO_2	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))		Preprinted Material	