

Forsiktighetsregler

Bruk vernehansker av nitril, øyevern og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av damp/sprøytetåke, skal halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 brukes. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

Håndteringsfrist

Anbefalt verneutstyr må nyttes dersom en går inn i behandlet område, eller håndterer behandlede plantedeler i en periode på 48 timer etter sprøyting.

Rengjøring

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes om lag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettleddningen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster. Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller et annet anbefalt vaskemiddel, for eksempel All Clear® Extra.

Avfallshåndtering

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildes-

orteres. Konsentrerte preparatresten og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

Lagring

Lagring skjer i originalemballasje. Må ikke lagres ved temperaturer under 0 °C.

MERK

Vi garanterer at produktet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at produktet under alle forhold har den forventede virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaringer. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten, bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.

Varemerke registrert av:

CDQ™ SX®, Express® SX®, Harmony® 50 SX®, All Clear® Extra, Harmony® Plus 50 SX®, Ratio® Super SX®: FMC Corporation
Titus®: DuPont
Reglone®: Syngenta

Tilvirker: AMETECH FRANCE

24 Rue de la mouche, 69540 Irigny - France

Registreringsholder:

Cheminova A/S
Tyborønvej 78,7673 Harbøøre
Denmark - Tlf: +47 952 84 650

F-00600/31811 - NORWAY

FMC

DP-KLEBEMIDDEL

Alkohol-Etoksylyat

Klebmiddel for tilsetning til ulike ugras- og vekstregulerende midler.

Sammensetning:

Alkohol-etoksylyat
(CAS: 61827-42-7) 88 vektprosent
Fyllstoffer 12 vektprosent

Avgiftsklasse 0

Fabrikasjonsnummer/Fabrikasjonsår:

Reg. nr. 2014.7.18
Se siden av pakningen

* Registrert varemerke tilhører FMC Corporation eller tilknyttede selskaper

FARE

Farlig ved svelging.

Farlig ved innånding.

Gir alvorlig øyeskade.

VED SVELGING: Kontakt GIFTINFORMASJONEN eller lege ved ubehag.

VED KONTAKT MED ØYENNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONEN eller lege.

Unngå innånding av aerosoler.

Oppbevares innelåst.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).



Nettoinnhold: **1 L**

Bruksrettleddningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke DP-klebemiddel i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

Bruksområde

DP-klebemiddel kan brukes sammen med visse ugras- og vekstregulerende preparater i jord- og hagebruksvekster der dette er angitt på etiketten. DP-klebemiddel kan for eksempel brukes sammen med sulfonyleurea (CDQ™ SX®, Express® SX®, Express® Gold SX®, Harmony® 50 SX®, Harmony® Plus 50 SX®) samt med klormekvatklorid-preparater og Reglone® (dog ikke for nedsviing i potet). Følg de respektive preparaters etiketter for å se når klebemiddel anbefales.

DP-klebemiddel frarådes brukt i veksthuskulturer pga. fare for skade.

Virkemåte

DP-klebemiddel minsker overflate-spenningen i sprøytevæsken. Dermed minsker dråpestørrelsen og sprøyte-væskens dekning og evne til å feste seg på bladene øker. Alt dette medfører at plantevernmiddelet virker mer effektivt. Spesielt merkes dette under tørre forhold ved ugrassprøyting, da ugraset utvikler tykt voks sjikt.

Bruksrettleddning

RIST KANNEN FØR TILMÅLING !

Dosering av DP-klebemiddel per 100 l sprøytevæske i blanding med:

CDQ™ SX®	50 ml
Express® SX®	50 ml
Express® Gold SX®	50 ml
Harmony® 50 SX®	50 ml
Harmony® Plus 50 SX®	50 ml
Ratio® Super SX®	50 ml
Andre sulfonyleurea-preparater i korn /gras	50 ml
Klormekvatklorid-preparater	50 ml
Reglone	
(ikke nedsviing i potet)	100 ml
Titus®	100 ml

Tillaging av sprøytevæske:

1. Fyll tanken halvfull med vann.
2. Tilsett først sulfonyleurea produktet, deretter evt blandingspartner etter at røreverket er satt i gang.
3. Fyll opp med vann og hell i tilmålt mengde DP-klebemiddel til slutt.
4. Hold deretter røreverket i gang inntil sprøytingen er avsluttet. Produktet er tilsatt skumdemper.

