

**FMC****GRANSTAR® SX®**  
Ugrasmiddel

GROUP 2 HERBICIDE

Tribenuron-metyl

**Formulering:** Vannløselig granulat (SG)**Bruksområde:** Mot tofrøbladet ugras i vår- og høstvetete, bygg, havre, rug og rughvete, gjenlegg av gras og rødkløver til fôr og kom med fangvekster av gras. Timotei-, engklein- og bladfakstrøeng samt i varig beite.**Sammensetning:**Tribenuron-metyl (CAS nr. 101200-48-0) 500 g/kg  
Fyllstoffer 500 g/kg**100g e****FMC**FMC Agricultural Solutions A/S  
Thyborønvej 78, 7673 Harboøre Danmark  
Tlf: +45 96909690  
www.fmcagro.no**BEHANDLINGSFRIST:**

Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal før 7 dager etter behandling.

**Lagres tørt i uåpnet originalemballasje. Åpnet emballasje må holdes godt tilslukket.****Registreringsholder:**FMC Agricultural Solutions A/S  
Thyborønvej 78, 7673 Harboøre, Danmark  
Tlf: +45 96909690  
www.fmcagro.no

\* Registrert varemerke tilhører FMC Corporation eller tilknyttede selskaper

Reg.nr. 2020.16.21

**Avgift klasse 1****ADVARSEL** UFI 991X-82PF-7N42-C71N

Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Unngå innånding av aerosoler. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann og såpe.

Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Tilsølte arbeidstøyer må ikke fjernes fra arbeidsplassen.

Oppbevares innelåst. Oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler). Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).



11013427\_22058965\_NORWAY

155/150 x 70 - 11013427\_22058965\_LBL\_ML-F\_100G\_GRANSTAR SX\_NO\_3\_BOOKLET\_8pages.indd 1

22/03/2023 16:34

P 032C P 2408C CYAN MAGENTA YELLOW BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Norway	Single label	
Product SKU	11013427	Base for Booklet	
Product SKU Description	GRANSTAR SX_100G_NO	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22058965	Number of pages (Booklet)	8 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_100G_GRANSTAR SX_NO_3	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))	22047117 22052114	Preprinted Material	

**Bruksrettleidingen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke Granstar® SX® i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.**

#### BRUKSOMRÅDE

Granstar® SX® er tillatt brukt i vår- og høstvetete, bygg, havre, rug og rughvete, gjenlegg av gras og rødkløver til fôr (med og uten korn som dekkvekst) og korn med fangvekster av gras. Timotei-, engkvein- og bladfaksfrøeng samt i varig beite.

#### VIRKEOMRÅDE

Granstar® SX® er et bredtvirkende ugrasmiddel mot tofrøbladet ugras.

#### VIRKNING OVERFOR UGRAS I KORN

Granstar® SX® har god virkning mot de fleste frøugras og enkelte tofrøblada rotugras i korn. Sen sprøyting, inntil begynnende blomsterknoppdannelse, gir fortsatt god virkning på arter nevnt under meget god virkning.

#### Meget god virkning mot:

Balderbrå, då, hønsegras, linbendel, meldestokk, oljevekster, rødtvetann, stivdylle, tunbalderbrå, vassarve, åkerminneblom og korsblomstra ugras.

#### Tilfredsstillende virkning mot:

Haremat og vindelslirekne.

#### Ikke tilfredsstillende virkning mot:

Jordrøyk, klengemaure, tungras og åkerstemorsblom.

#### VIRKNING OVERFOR UGRAS I BEITE

##### Meget god virkning mot:

Balderbrå, engsoleie, gjetertaske, krypsoleie, løvetann og vassarve.

##### Tilfredsstillende virkning mot:

Hundekjeks.

##### Mindre god virkning mot:

Engsyre, høymole, småsyre og stornesle (brennesle).

#### VIRKEMÅTE

Granstar® SX® er et systemisk herbicid som bekjemper de fleste frøgras i korn effektivt (se ovenfor). Granstar® SX® er hovedsakelig et bladherbicid. Den raske nedbrytningen av Granstar® SX® i jorda fører til at jordvirkningen er begrenset. Det virksomme stoffet, tribenuron-metyl, blir hurtig tatt opp gjennom ugrasets blad. Best virkning oppnås når ugraset er ungt og i god vekst. Ugrasplantenes vekst stanser raskt etter sprøyting. Ytterligere synlig virkning viser seg i løpet av 1-2 uker. Virkningen sees først i ugrasets vekstpunkt, deretter visner ugraset ned. Granstar® SX® virker ved lave temperaturer (fra 5°C), hvis ugraset er i aktiv vekst. Når sprøytevæsken har tørket inn på bladene, vil ikke regn redusere virkningen nevneverdig.

BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Norway	Single label	
Product SKU	11013427	Base for Booklet	
Product SKU Description	GRANSTAR SX_100G_NO	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22058965	Number of pages (Booklet)	8 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_100G_GRANSTAR SX_NO_3	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))	22047117 22052114	Preprinted Material	

**RESISTENS**

Granstar® SX® tilhører den kjemiske gruppen sulfonylurea HRAC gruppe: 2 (tidligere B). Resistens mot preparat tilhørende sulfonylurea-gruppen er kjent hos tilfeller av vassarve, samt enkeltstående tilfelle i balderbrå, då, linbendel, stivdylle og hønsegras i Norge. Ensidig bruk av ett middel, eller en gruppe midler med samme virkningsmekanisme, kan føre til at naturlig resistente individ av en ugrasart oppformerer og blir dominerende med resistens eller nedsatt følsomhet for midlet/middelgruppen som resultat. Derfor skal midler fra ulike middelgrupper og/eller alternative bekjempelsesmetoder alltid inngå i bekjempelsesprogrammet. For å forebygge resistensutvikling, skal Granstar® SX® eller midler med samme virkningsmekanisme brukes alene maksimalt 2 av 3 år. Det tredje året må det brukes / skiftes til et middel fra en kjemisk gruppe med en annen virkningsmekanisme eller tankblandes med denne eller ugrasharving. Dersom det alt er påvist resistens mot sulfonylurea på arealet, må Granstar® SX® ikke brukes, eller det må blandes med et preparat med en annen virkningsmekanisme som er effektivt mot denne/de aktuelle ugrasarten(e).

**LYSNING I FARGEN**

Komplantene kan under visse forhold få en forbigående lysere farge i 4 - 10 dager etter behandlingen. Forsøk og praktisk erfaring har vist at dette ikke har betydning for avlingen.

**BRUKSRETTLIGNING****Spredde- / klebemiddel**

Et godkjent spredde-/klebemiddel som DP-klebemiddel må alltid tilsettes sprøytevæsken når Granstar® SX® brukes alene. Dette forbedrer virkningen på ugras som er vanskelige å fukte.

DP-klebemiddel må også tilsettes når Granstar® SX® blandes med Cycocel®750, Primor®, Puma Extra®, eller Tomahawk®. Sprøytevæsken tilsettes 25-50 ml (0,025-0,05 l) DP-klebemiddel pr. 100 liter vann. Væskemengden bør være 10-30 liter pr. dekar.

**Dosering i ulike kulturer:****Faktorer som påvirker ugraseffektene og valg av dose**

Redusert dose	Maksimal dose
Følsomme ugrasarter	Mindre følsomme ugrasarter
Kraftig konkurranse fra åkeren	Tynnere åker
God jordfuktighet, sterk tilvekst	Tørkestress
Liten ugrasforekomst	Rikelig ugrasforekomst
Små ugras	Stort ugras
Utviklet sprøyteknikk	Dårlig sprøyteknikk
Høy luftfuktighet (over 80%)	Lav luftfuktighet (under 80%)

**Vårkom**

Maks dose Granstar® SX® per dekar og år i vårkom: 1,5 g

Sprøytetidspunkt	Dose per dekar	Merknader / kommentarer
Best ugrasvirkning når ugraset har 2 - 4 varige blad. Kornet har da som regel også 2-4 blad.	1,0 - 1,5 g per daa + 50 ml DP-klebemiddel per 100 l sprøytevæske	Laveste dosering ved smått ugras og gode sprøyteforhold, høyeste dose hvis ugraset har mer 4 varige blad eller ved mye jordrøyk, tungras eller åkerstemorsblom

BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Norway	Single label	
Product SKU	11013427	Base for Booklet	
Product SKU Description	GRANSTAR SX_100G_NO	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22058965	Number of pages (Booklet)	8 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_100G_GRANSTAR SX_NO_3	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))	22047117 22052114	Preprinted Material	

Forekommer åkerdyll eller åkertistel utsettes sprøytetidspunktet til disse er på rosettstadiet til begynnende strekningsvekst (ca. 10 cm blomsterstengel). Ved stor forekomst av åkerdyll eller åkertistel anbefales å sprøyte med Granstar® SX® først mot frøgras, og supplere / flekksprøyte senere med et MCPA-preparat. Alternativt tankblandes minste dose Granstar® SX® og 130 ml av et MCPA-preparat, og sprøytetidspunktet utsettes. Rett sprøytetidspunkt er når rotgraset er på rosettstadiet med begynnende strekningsvekst (ca.10 cm blomsterstengel) for å få tilfredsstillende virkning. Ved stor forekomst av klengemaure anbefales en tankblanding med Tomahawk® eller et annet fluroksypyr-holdig produkt.

#### Høstkorn

Maks dose Granstar® SX® per dekar og år i høstkorn: 1,875 g

Sprøytetidspunkt	Dose per dekar	Merknader / kommentarer
Best ugrasvirkning når ugraset har kommet i god vekst om våren. Temperaturen bør være over 5 °C ved sprøyting	1,1 - 1,875g per daa + 50 ml DP- klebemiddel per 100 l sprøytevæske	Laveste dosering kun ved smått ugras og gode sprøyteforhold, høyeste dose hvis ugraset har mer enn 4 varige blad eller ved mye tungras eller åkerstemorsblom

#### Frøeng av timotei, bladfaks og engkvein

Maks dose Granstar® SX® per dekar og år i frøeng av timotei, bladfaks og engkvein: 1,5 g

Om våren når graset er ca. 10 cm: Bruk 1,1 - 1,5 g Granstar® SX® per dekar) + normaldose sprede-/ klebemiddel.


Spesielt god virkning oppnås mot stor balderbrå, god virkning også mot vassarve og rødtvetann. Forbigående veksthemming av frøenga er vanlig ved vårsprøyting uten at dette gir negative utslag på høstetidspunkt og trøaving.

#### Gjenlegg med gras og rødkløver til før eller gras til fangvekst

Maks dose Granstar® SX® per dekar og år i gras- og rødkløvergjenlegg: 0,75 g  
Maks dose Granstar® SX® per dekar og år i gras til fangvekst: 1,125 g

Beste sprøytetidspunkt er når kløveren har 1 trekopla blad. Se fig. Grasgjenlegg uten kløver sprøytes når graset er fullt framspirt med minst 2 blad. Kløverens utviklingsstadier:

#### Kløverens utviklingsstadier.



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Norway	Single label	
Product SKU	11013427	Base for Booklet	
Product SKU Description	GRANSTAR SX_100G_NO	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22058965	Number of pages (Booklet)	8 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_100G_GRANSTAR SX_NO_3	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))	22047117 22052114	Preprinted Material	

Sprøyting kan foretas både i gjenlegg med gras eller gras + rødkløver til før med eller uten korn som dekkvekst. **OBST Granstar® SX® skal ikke brukes i eng til slått!** I grasgjenlegg med eller uten kløver til før som skal slås i gjenleggsåret er det risiko for stråforkorting ved sprøyting med Granstar® SX®. Gjenlegg med frøblanding inneholdende hvitkløver og alsikkekløver frarådes sprøytet med Granstar® SX®.

Gjenlegg og dosering: Tilpass dosen til gjenlegget og ugrasforekomst i henhold til følgende:

Gjenlegg	Dose per dekar
Gras og rødkløver i blanding	0,75 g + 50 ml MCPA-preparat per daa. <b>NB! Ikke klebemiddel.</b>
Grasgjenlegg uten kløver	0,75 g per daa + 25 ml DP-klebemiddel per 100 l sprøytevæske.
Gras til fangvekst (raigras, hundegras)	1,1 g per daa + 25 ml DP-klebemiddel per 100 l sprøytevæske.

**Ugraseffekter:** Dosene og dermed ugraseffektene er noe lavere enn de som er angitt for korn.

#### Merk!

Engsvingel i gjenlegg kan hemmes / tynnes, og Granstar® SX® anbefales ikke i engsvingelgjenlegg i reinbestand. Tilveksten stopper midlertidig opp og man kan ane en svakt lysegul farge på plantene. Rødkløveren kan også skades / hemmes. Engsvingel- og rødkløverplantene tar seg som regel igjen og vokser og utvikler seg normalt etter at dekkveksten er høstet og halmen berget. Den tilbakeholdende effekten på gjenlegget under dekkvekstens utvikling kan dessuten være en fordel om man har en svak utvikling av dekkveksten, da kløveren risikerer å vokse igjennom og skape problemer ved den kommende treskinga.

#### Varig beite

Maks dose Granstar® SX® per dekar og år i beite: 1,5 g

Granstar® SX® kan sprøytes fra tidlig vår til sein høst forutsatt at ugraset er i vekst og innen blomstring av ugraset. Aktuell sprøyte tid er 1-3 uker før avbeiting, men som regel er effekten best når bekjempelsen utføres ca. 14 dager etter en beitepussing. Se tabell:

Sprøyte tidspunkt	Dose per dekar
Fra tidlig vår til sein høst, forutsatt ugraset i vekst.	1,5 g per daa + 50 ml DP-klebemiddel per 100 l sprøytevæske.

**NB!** Beitegraset kan temporært hemmes i veksten. Hvitkløveren kan veksthemmes sterkere og temporært uttynnes, men kommer seg igjen ved normale betingelser.

BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Norway	Single label	
Product SKU	11013427	Base for Booklet	
Product SKU Description	GRANSTAR SX_100G_NO	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22058965	Number of pages (Booklet)	8 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_100G_GRANSTAR SX_NO_3	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))	22047117 22052114	Preprinted Material	

**BEGRENSING AV ANVENDELSEN / OMSÅING**

Hvis en kornåker som er sprøytet med Granstar® SX® såes om, må det kun såes korn. Bruk ikke Granstar® SX® eller Harmony® Plus 50 SX® eller et annet sulfonylurea-produkt i den omsådde kornåkeren. På høsten etter vårbehandling med Granstar® SX® kan det såes korn, eventuelt med gjenlegg og høstoljevekster. Det bør ikke plantes/såes spesialkulturer (for eksempel roser), hvis det er brukt Granstar® SX® om våren. Etterfølgende vår er det ingen begrensning i hvilke vekster som kan såes/ plantes.

**FØLSOMME SORTER**

Havresorten Matilda kan i visse fall være følsom. Doser høyere enn 0,5 g per daa anbefales ikke, og dermed blir ugrasvirkningen dårligere. På grunn av ovenstående frarådes sprøyting i Matilda havre.

**BLANDBARHET**

Husk alltid også å lese etiketten for de produkter som det blandes med, det gjelder særlig for eventuell tilsetning av olje eller klebemiddel og mulige restriksjoner i bruken. Granstar® SX® kan generelt blandes med de fleste plantevernmidler. Det bør maksimalt blandes 2 produkter. Granstar® SX® kan med nåværende erfaring blandes med Harmony® Plus 50 SX®, Ariane® S, Cycocel® 750, Gratil®, YaraVita® MANTRAC PRO, Primus® og Tomahawk®.

**Ved blanding, begynn alltid med Granstar® SX® først i tanken. Når granulaterne er helt oppløst tilsettes produktet det skal blandes med under kontinuerlig omrøring.**

**TILLAGING AV SPRØYTEVÆSKE**

Fyll sprøytetanken halvfull med vann, og tilsett det beregnede antall gram Granstar® SX® under omrøring. Når det er oppløst tilsettes en eventuell blandingspartner. Fyll opp sprøytetanken med vann og tilsett den tilmålte mengde sprede-/ klebemiddel /blandingspartner under stadig omrøring. Når sprede-/ klebemiddel skal tilsettes sprøytevæsken, skal den alltid være det siste preparatet som blir tilsatt. Sprøytevæsken skal sprøytes ut senest 24 timer etter tillaging. Blandinger med andre midler sprøytes imidlertid ut straks.

**SPRØYTELUSTYR OG BRUK**

Granstar® SX® utsprøytes med en teknikk som sikrer en god og ensartet dekning av ugrasplantene. Bruk flatdyser, for eksempel ISO 110 - 02 dyse med et trykk på 2,0 - 3,0 bar, eller en tilsvarende Low-drift dyse. Det brukes normalt 10 - 20 liter vann per dekar. I meget tette og kraftige åkre eller ved kraftig bestand av ugras kan det være nødvendig å øke vannmengden for å sikre tilstrekkelig dekning.

BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Norway	Single label	
Product SKU	11013427	Base for Booklet	
Product SKU Description	GRANSTAR SX_100G_NO	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22058965	Number of pages (Booklet)	8 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_100G_GRANSTAR SX_NO_3	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))	22047117 22052114	Preprinted Material	

Anbefalte vannmengder og sprøyteteknikk:

Korn (10 – 20 liter vann per dekar)

Dyse	Trykk	Hastighet	Vannmengde
ISO 110-02 (gul)	2 bar	7,8 / 6,3 km/time	10 / 12,5 l / daa
	3 bar	6,4 / 5,5 km/time	15 / 17,5 l / daa

Dyse	Trykk	Hastighet	Vannmengde
ISO 110-03 (blå)	2 bar	7,8 / 5,9 km/time	15 / 20 l / daa
	3 bar	9,6 / 7,2 km/time	15 / 20 l / daa

#### FORSIKTIGHETSREGLER

Bruk vernehansker av nitril, ansiktsskjerm og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet.

Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av damp/sprøytetåke, skal halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 brukes.

Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00

#### HÅNTERINGSFRIST

Anbefalt verneutstyr må nyttes dersom en går inn i behandlet område, eller håndterer behandlede plantedeler i en periode på 24 timer etter sprøyting.

#### RENGJØRING AV TOMEBALLASJE

Tomemballasjen skylles minst 3 ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken.

#### RENGJØRING AV SPRØYTEUTSTYR ETTER GRANSTAR® SX®

Begynn alltid sprøytearbeidet med ei ren sprøyte. Inntørkede hinner fra en tidligere sprøyting kan inneholde rester, som frigjøres og gir skade i senere kulturer. Dette gjelder generelt for alle produkter.

Sprøyteutstyret bør alltid rengjøres etter avsluttet sprøyting, og ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres, i henhold til rengjøringsprosedyrene angitt nedenfor:

**MERK!** Husk å tømme sprøytetåke helt mellom hver skylling/vask. Aktiver alle kraner og ventiler. Øk trykket så meget at overtrykksventilen fra det selvrensende filter utløses.

#### FØRSTEHJELP:

**Innånding:** Flytt personen ut i frisk luft og kontakt lege.

**Hudkontakt:** Skyll eksponerte områder grundig med såpe og vann umiddelbart. Kontakt lege ved vedvarende irritasjon.

**Øyekontakt:** Skyll umiddelbart med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser og fortsett å skylle. Kontakt lege ved vedvarende irritasjon.

**Svelging:** Skyll munnen umiddelbart og drikk vann; ikke framting oppkast. Kontakt lege umiddelbart.

Informasjon til lege: Symptombehandling (detoksifisering, gjenopprettelse av vitale funksjoner); ingen spesiell motgift tilgjengelig.

Ved forgiftning, kontakt Giftinformasjonssentralen på tlf. 22 59 13 00

BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Norway	Single label	
Product SKU	11013427	Base for Booklet	
Product SKU Description	GRANSTAR SX_100G_NO	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22058965	Number of pages (Booklet)	8 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_100G_GRANSTAR SX_NO_3	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))	22047117 22052114	Preprinted Material	

**Rengjøring av sprøyter med montert tankskylledyse**

- 1) Etter avsluttet sprøyting fortynnes rester fra sprøyteanken omlag 5 ganger med rent vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettleiingen. Tøm sprøyten **helt**.
- 2) Skyll straks etter avsluttet sprøyting sprøytestyr grundig med rent vann - både innvendig og utvendig. Tøm tanken ved å sprøyte skyllevannet ut gjennom bom og dyser. Skylling av sprøytestyr med vann etter bruk skal foregå på et sted som ikke gir fare for forurensing av vannforekomster. Skyllevannet kan eventuelt sprøytes over den vekst som akkurat er blitt sprøytet.
- 3) Fyll vann i tanken 10 - 15 % av tankkapasiteten (100-150 liter vann i en 1000 liters tank) og tilsatt 0,5 l All Clear® Extra per 100 liter vann. Skyll litt av vaskevannet ut gjennom bom og dyser, så disse blir våte. La omrøring og tankskylledyse gå i minst 15 minutter. Tøm sprøyta gjennom bom og dyser, over et egnet areal.
- 4) Dyser, siler og filtre demonteres og renses i vann tilsatt 50 ml All Clear® Extra per 10 liter vann.
- 5) Skyll tanken grundig i 5 minutter med rent vann. Tøm sprøyten gjennom bom og dyser over et egnet areal som ikke gir avrenning til vann.  
Ved bruk av tankskylledyse og rentvannstank kan pkt. 2. med fordel startes i åkeren. Er det likeledes tilstrekkelig med vann i rentvannstanken, kan pkt. 3. også startes.  
Tankskylledysens og omrøringen skal holdes i gang mens det kjøres hjem. Vaske- og skyllevannet tømmes på et sted som ikke gir avrenning til vann.

**Rengjøring av sprøyter uten montert tankskylledyse**

I stedet for å bruke 10-15% av tankkapasiteten under pkt. 3. ovenfor (vasking), skal tanken fylles helt med vann. Sørg for at punktene 2. og 5. kommer i god kontakt med alle innvendige flater i tanken.

**AVFALLSHÅNDTERING**

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte preparater og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

**LAGRES**

Magres tørt i uåpnet originalemballasje. Åpnet emballasje må holdes godt tillukket.

**MERK**

Vi garanterer at produktet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at produktet under alle forhold har den forventede virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaringer. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten, bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.

**VAREMERKER REGISTRERT AV:**

- \* FMC, FMC logo, Granstar, SX, Harmony, All Clear, DP-klebemiddel are trademarks of FMC Corporation and/or its affiliates.
- ©2023 FMC Corporation. All rights reserved.
- \* Cycozol 750; BASF.
- \* YaraVita MANTRAC PRO; Yara International ASA.
- \* Gratil og Puma Extra; Bayer CropScience.
- \* Ariane S og Primus; Corteva
- \* Tomahawk; Nufarm.

BLACK



	FILL IN		DIMENSIONS (WXH)
Country	Norway	Single label	
Product SKU	11013427	Base for Booklet	
Product SKU Description	GRANSTAR SX_100G_NO	Booklet	155/150 x 70 mm
Label SKU	22058965	Number of pages (Booklet)	8 pages
Label SKU Description	LBL_ML-F_100G_GRANSTAR SX_NO_3	Carton label	
Label SKU (earlier version(s))	22047117 22052114	Preprinted Material	