

Tripali®


Ugrasmiddel

Et nytt bredtvirkende ugrasmiddel

Mot tofrøbladet ugras i hvete, havre, bygg, rug og rughvete.
Kun til vårbehandling.

Verksomt stoff	83 g/kg metsulfuronmetyl 83 g/kg tribenuronmetyl 105 g/kg florasulam
Formulering	Vanndispergerbart granulat (WG)
Pakning	250 g
Dose	2,5-3,5 g/daa

Tripali® kombinerer tre aktive substanser som absorberes av plantene gjennom bladene og røttene, noe som muliggjør et optimert opptak uansett miljøforholdene.




Anbefalt bruk

Kultur	BBCH	Maks antall behandlinger	Maks dose / behandling	Merknad
Høstkorn: Hvete, rug, rughvete	23-39	1	3,5 g/daa	Kun vårbehandling. Bruk ikke-ionisk klebemiddel 0,05%, f.eks. DP-klebemiddel
Høstkorn: Bygg	23-30	1	3,5 g/daa	Kun vårbehandling. Bruk ikke-ionisk klebemiddel 0,05%
Vårkorn: Hvete, bygg	20-39	1	3,5 g/daa	Bruk ikke-ionisk klebemiddel 0,05%
Vårkorn: Havre	20-30	1	2,5 g/daa	Bruk ikke-ionisk klebemiddel 0,05%

Mot tistel

Anbefaling tistel	Effekt
3,5 gram Tripali + 100 ml MCPA + 0,05 % ikke-ionisk klebemiddel	> 90 %



BRUK PLANTEVERN MIDLER SIKKERT. LES ALLTID ETIKETTEN FØR BRUK!



PROTECT FOR BETTER GROWTH

Tripali®

Ugrasmiddel

Enestående bekjempelse av frøugras

Tripali® is trademark of FMC Corporation or an affiliate.

Ugraseffekter Tripali® 3,5 g				
	Vårkorn		Høstkorn	
Ugras/Effekt	> 90%	70-90 %	> 90 %	70-90 %
Balderbrå	x		x	
Kornblom	x		x	
Då	x			
Åkerminneblom	x			x
Gullkrage		x	-	
Jordrøyk		x	-	
Gjetertaske	x		x	
Meldestokk	x		x	
Pengeurt	x		x	
Høsegras	x		x	
Rødtvetann	x		x	
Klengemaure	x		x	
Spillraps	x		x	
Tungras		x		x
Kornvalmue		-	x	
Veronika		x		x
Åkerstemorsblom	x		x	
Vassarve	x		x	
Vindeslirekne	x		x	
Åkersennep	x		-	
Linbendel	x		-	

Øvrig info

Temperatur	Over 5 °C
Regnfasthet	For optimal effekt, 1-2 timer
Virkemåte	Bladvirkning, jordvirkning, systemisk
Dusjkvalitet	Fin-medium
Registreringsnummer	2019.5
Avgiftsklasse	1
Lagring	Frostfritt
Pakning	250 g
Tilvirker	FMC

Omsåing

En måned etter behandling skal man kun så vårhvete med forutgående pløying innen såing.

Efterfølgende kulturer

Ved normalt vekstskifte kan man så følgende kulturer etter behandling med Tripali®:

Innen tre måneder etter behandling med Tripali® kan korn uten gjenlegg såes, men se følgende restriksjoner:

- Ved behandling med maks. 3,5 g/daa Tripali® kan du etter to måneder så korn med eller uten gjenlegg av gras/kløver og hørstraps*.

Våren etter kan man så korn med eller uten gjenlegg av gras/kløver, våroljevekster, poteter*, erter, åkerbønner, mais og lin.

I mangel av tilstrekkelig informasjon anbefales ikke å dyrke grønsaker, blomster, prydevekster, løker, busker eller trær året etter man har behandlet med Tripali®.

Om Tripali® brukes i blandning med et annet produkt les alltid blandningspartnerens etikett og kontakt din representant for råd. Vær særskilt oppmerksom ved tankblanding med andre produkter som helt eller delvis inneholder samme virksomme stoff.

*) På jorder med 50% sand og pH>8, kan det oppstå gulfarging av hørstraps og poteter.

Omsåing og etterfølgende kulturer

Tripali® har en viss jordvirkende effekt avhengig av dosen, jordens pH, organisk materiale i jorden, tid etter behandling, dyrkingsmetoder og miljøforhold. Følg derfor følgende anbefalinger:

Kontakt: FMC Agricultural Solutions, Norge
Trond Anstensrud
Tel: 952 84 650
www.fmcagro.no