

Ratio® Super SX® Ugrasmiddel



Spesialist mot vindeslirekne. Formulert med unik SX®-teknologi

HØSTHVETE - VÅR HVETE - HØSTBYGG - VÅRBYGG - HAVRE - RUGHVETE - RUG - GRAS - BEITE

REGISTRERINGSNUMMER	2015.4		
SAMMENSETNING	250 g/kg tribenuron-metyl 250 g/kg tifensulfuron-metyl	HRAC Grupp	B 2
FORMULERING	Vannløselig granulat med FMC SX®-teknologi		
AVGIFTSKLASSE	1		
INNHold	200 g		

PRODUKTEGENSKAPER:

- Effektoptimert blanding av to SU-produkter
- Formulert med SX®-teknologi
- Forsterket effekt på høsegrasarter
- Perfekt blandingspartner til ugrasbekjempelse i vårkorn
- Ingen restriksjoner på bruk av halm.



BRUK

Ratio® Super SX® er tillatt brukt i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug og rughvete og gjenlegg av gras med korn som dekkvekst.

VIRKEMÅTE

Ratio® Super SX® opptas raskt gjennom bladene. Selv om det går 1-3 uker, før det er synlig virkning på ugraset i form av gule/svarte, senere døde vekstpunkt, er veksten stanset på få timer. Ratio® Super SX® har god virkning selv ved lave temperaturer, hvis ugrasplantene er i aktiv vekst.

Enkelte netter med nattefrost eller regn få timer etter sprøytingen påvirker ikke ugrasvirkningen. Optimal virkning oppnås dog ved temperaturer over 10°C, siden ugraset da vokser konstant. Regn vil ikke påvirke effekten, hvis det har vært oppholdsvær 4 timer etter sprøytingen og sprøytevæsken har tørket inn på plantene.

Unngå alltid vindavdrift til åpent vann, lebelter, naboåkre eller arealer hvor det skal dyrkes annet enn korn.

TEKNOLOGI

FMC's patenterte formuleringsteknologi SX® innebærer at produktet blandes i sprøyten til en ekte løsning (ikke suspensjon). Dette gir effektivere opptak i ugraset, mindre risiko for rester, samt raskere tilberedning av sprøytevæska.





BRUK AV RATIO® SUPER SX®

KULTURER	MAXIMAL DOSE	SPRØYTETIDSPUNKT	ANMERKNINGER
Vårkorn	3,0 g/daa	BBCH 12-39	Tilsett 50 ml DP klebemiddel per 100 l sprøytevæske
Høstkorn	3,0 g/daa	BBCH 23-39	Tilsett 50 ml DP klebemiddel per 100 l sprøytevæske
Korn med gjenlegg av gras til fôr	0,75 g/daa	Behandling foretas når gras er fullt framspirt med minst 2 blad	Tilsett 25 ml DP klebemiddel per 100 l sprøytevæske
Korn med gjenlegg av gras til fangvekster	1,1 g/daa	Behandling foretas når gras er fullt framspirt med minst 2 blad	

VIRKNINGSTABELL VÅRKORN UTEN GJENLEGG NB

UGRASART	2,0 g/daa Ratio Super SX + 80 ml/daa Starane XL	3,0 g/daa Ratio Super SX + Klebemiddel	UGRASART	2,0 g/daa Ratio Super SX + 80 ml/daa Starane XL	3,0 g/daa Ratio Super SX + Klebemiddel
BALDERBRÅ	1	1	MELDESTOKK	1	1
BALDERBRÅ, RESISTENT	2-3	4	OLJEVEKSTER	1	1
DÅ-ARTER	1	1	PENGEURT	1	1
DÅ-ARTER, RESISTENT	2	4	RØDTVETANN	1	1
GJERTERTASKE	1	1	STEMORSBLOM	3	2-3
GULLKRAGE	3	3	STIVDYLLE	1	1
HAREMAT	1	2	STIVDYLLE, RESISTENT	3	4
HØNSEGRAS	1	1	STORKENEBB	1	3
HØNSEGRAS, RESISTENT	2	4	TRANEHALS	1-2	2
JORDRØYK	3	3	TUNBALDERBRÅ	1	1
KLENGEMAURE	1	2*	TUNGRAS	1	1
LINBENDEL	1	1	TUN-MARKRAPP	4	4
LINBENDEL, RESISTENT	4	4	SVARTSØTVIER	2	2
VERONIKA- ARTER	Ukjent	4			

VIRKNING

1 = > 90 %	2 = 75- 89 %	3 = 50 - 74 %	4 = < 50 %	UKJENT
------------	--------------	---------------	------------	--------

Kilde: Norgesfôr fra plantekultur.no